

Antistolling bij operaties hartritme

Na de behandeling aan hartritmestoornissen gaat u medicijnen gebruiken die de stolling van het bloed remmen. Dit noemen we antistolling. Het is bedoeld om vorming van bloedstolsels te voorkomen.

Tijdens de operatie wordt u behandeld aan ritmestoornissen. We maken dan littekenweefsel in de boezem(s) van het hart. U kunt de eerste 3 tot 6 maanden na de operatie nog ritmestoornissen krijgen.

Daarom moet u na de operatie ten minste 3 maanden bloedverdunners gebruiken. Uw cardioloog beoordeelt daarna of het hartritme regelmatig is en of het veilig is om te stoppen met de bloedverdunners.

Bent u ook aan een hartklep geopereerd? Dan is het mogelijk dat u langer door moet gaan met de bloedverdunners. Vanzelfsprekend bespreken wij dit met u voordat u uit het ziekenhuis vertrekt. Zo nodig melden we u weer aan bij de trombosedienst.

Als u vóór de operatie een NOAC gebruikte als antistollingsmedicatie, is het in sommige situaties mogelijk om dit zelfde medicijn na de operatie weer te herstarten. Dit bespreken we met u.

U komt dan niet onder controle te staan van de trombosedienst.

Voorbeelden van NOAC zijn:

- Dabigatran, Pradaxa®
- Rivaroxaban, Xarelto®
- Apixaban, Eliquis®

Vragen?

U kunt ons gewoon bellen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Meer informatie online

- www.olvg.nl/hartcentrum

Contact

afdeling Cardiothoracale Chirurgie (CTC), locatie Oost

verpleegafdeling C4

T 020 599 24 04 (dag en nacht bereikbaar)

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden

Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 12 juni 2020, foldemr.3859